

**REPARAZIONE PER ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA
E
ISTEROSCOPIA OPERATIVA SENZA SEDAZIONE**

NEI 3 GIORNI PRECEDENTI L' ESAME LA PAZIENTE DEVE ASSUMERE :

NEOXENE LAVANDA VAGINALE (PRIMA) E NEOXENE OVULI (DOPO)
(Effettuare mattina e sera la lavanda vaginale prima di inserire l'ovulo)

LA SERA PRIMA E LA MATTINA DELL' ESAME LA PAZIENTE DEVE ASSUMERE:

BUSCOPAN 1 COMPRESSA

ZIMOX 1GR 1 COMPRESSA

ED INSERIRE ALL' INTERNO DELLA VAGINA:

GELISTROL GEL VAG 50 mcg (una applicazione la sera e una la mattina prima dell'esame)
·0

Prima dell'esame si raccomanda di **RISPETTARE UN DIGIUNO** di almeno **DUE ORE da SOLIDI e LIQUIDI** (non mangiare e non bere nessun tipo di liquidi).

Nel caso l'isteroscopia diagnostica si dovesse trasformare in operativa, se la paziente sopporta bene l'esame, si procederà senza sedazione, viceversa verrà preso un nuovo appuntamento per isteroscopia operativa in sedazione.

Se la paziente ha osservato di propria spontanea volontà, un digiuno di almeno 6/8 ore ed ha con se' gli esami pre-anestesiologici (Elettrocardiogramma (Validità esame 6 mesi) - AZOTEMIA GLICEMIA COLINESTERASI TRANSAMINASI PT PTT EMOCROMO ESAMI URINE (Validità esami 6 mesi) - Gruppo e Fattore Rh (validità esami illimitata)) potrà essere sottoposta ad isteroscopia operativa in sedazione.

·1 IN CASO DI ALLERGIE A FARMACI CHIEDERE AUTORIZZAZIONE AL PROPRIO MEDICO CURANTE

·2 SI RACCOMANDANO RAPPORTI SESSUALI PROTETTI

·3 **NEI 2 GIORNI SUCCESSIVI L'ESAME LA PAZIENTE DEVE:**

NEOXENE LAVANDA VAGINALE (PRIMA) E NEOXENE OVULI (DOPO)
(Effettuare mattina e sera la lavanda vaginale prima di inserire l'ovulo)

·4 NELL'EVENTUALITÀ SI VOGLIA/POSSA USUFRUIRE DELLA SEDAZIONE NON ASSUMERE LA TERAPIA DEL MATTINO CON ACQUA. SE IMPOSSIBILITATE, SI PUÒ TRANQUILLAMENTE ASSUMERE TALE TERAPIA DOPO L'ESAME.